



Pz HCV positivi, falliti ai DAA di seconda generazione e trattati con Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir: esperienza dell'ambulatorio di distribuzione diretta farmaci.

Antonella Nappi¹, Daniela Ardolino², Marco Guerritore¹, Alessandra Crispo¹, Simona Ruggiero¹, Nunzia Papa¹, Micaela Spatarella¹.

1. UOSD di Farmacovigilanza, Farmacia P.O. Cotugno, AORN dei Colli, Napoli.
2. Controllo di qualità indirizzo farmaceutico-ospedaliero, Farmacia P.O. Cotugno, AORN dei Colli, Napoli.

Introduzione

Il Vosevi[®], DAA pangenotipico di terza generazione, contenente Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir, è indicato per il trattamento dell'epatite C cronica (HCV) negli adulti con e senza cirrosi.



Ha rimborsabilità a carico del SSN limitatamente ai pazienti (pz) HCV positivi con precedente fallimento ai DAA di seconda generazione, inclusi soggetti falliti agli inibitori NS5A (GU n. 90 del 18/04/2018; determina AIFA n. 617 del 12 aprile 2018). Alla luce dell'immissione in commercio del Vosevi[®] la Regione Campania ha aggiornato il PDTA per l'HCV e ha assegnato i trattamenti ai singoli centri prescrittori (D.D. n. 281 del 24/05/2018).

Obiettivo



Analisi dei pz HCV positivi, falliti a precedenti trattamenti con DAA di seconda generazione e ritrattati con Vosevi[®].

Materiali e Metodi

➤ Sono stati analizzati i pz HCV positivi che da giugno ad agosto 2018 hanno avuto accesso al trattamento con Vosevi[®].


➤ E' stato creato un file excel in cui sono stati riportati:
- i pz che hanno terminato, interrotto e in prosecuzione di cura;
- sesso, genotipo, criterio di arruolamento;
- tipo e durata dei precedenti trattamenti falliti nonché eventuali coinfezioni.

➤ I dati sono stati raccolti dalle prescrizioni, dal gestionale aziendale e dal registro di monitoraggio AIFA.




Risultati

Da giugno ad agosto 2018 nel P.O. Cotugno:



➤ Il 12,5% dei pz che hanno iniziato il trattamento con Vosevi[®] sono coinfezioni HIV/HCV.



➤ I pz in cura con Vosevi[®] risultano precedentemente falliti ai trattamenti:

- 25% Sovaldi[®] + Daklinza[®] (24 settimane);
- 12,5% Sovaldi[®] + Daklinza[®] (24 settimane) ed Epclusa[®] + Ribavirina (12 settimane);
- 25% Viekirax[®] + Exviera[®] (8 settimane);
- 12,5% Harvoni[®] (24 settimane) e Zepatier[®] (12 settimane);
- 12,5% Epclusa[®] (12 settimane) e 12,5% Epclusa[®] (4 settimane, trattamento interrotto perché il pz è stato perso al follow-up).

n° PZ	PRIMO TRATTAMENTO	SECONDO TRATTAMENTO
2	SOVALDI+DAKLINZA	
1	SOVALDI+DAKLINZA	EPCUSA+RIBAVIRINA
2	VIEKIRAX+EXVIERA	
1	HARVONI	ZEPATIER
1	EPCUSA	
1	EPCUSA	

Conclusioni

➤ Al 31 agosto 2018 dei 40 trattamenti assegnati al P.O. Cotugno dalla Regione Campania, il 20% ha iniziato.

➤ I primi risultati dei follow-up saranno valutati a fine settembre 2018.