

## Valutazione dell'appropriatezza prescrittiva delle EBPM e del Fondaparinux in dimissioni ospedaliere, in DD e nel territorio della Asl Roma 3

P. Cargino (1), A. Berti (2), A. Blasi (1), R. Di Turi (1), E. Pagnozzi (1), M. Mottola (1)

**Introduzione e scopo:** Con Determinazione G 07206 del 15/06/18 la Regione Lazio ha adottato il documento "Appropriatezza prescrittiva delle Eparine a basso peso molecolare" - EBPM. Il documento distingue le indicazioni mediche, chirurgiche e quelle di cui alla L. 648/96 per le singole EBPM e per il medicinale Fondaparinux, riportando tabelle con dosaggi suggeriti per singola indicazione, rammentando le dosi massime, la durata del trattamento e le modalità di erogazione previste (convenzionata, ospedaliera, DD). Sono state analizzate le prescrizioni effettuate nell'ambito dei tre diversi canali distributivi al fine di verificare l'appropriatezza prescrittiva ed eventualmente evidenziare le anomalie rilevate presso le Commissioni distrettuali dedicate (CAPD).

**Materiali e metodi:** Sono state analizzate le dispensazioni di EBPM e di Fondaparinux effettuate a livello ospedaliero (ospedale G.B. Grassi di Ostia - RM) e a livello di DD (servizio farmaceutico territoriale Roma3) tramite il sistema Areas aziendale nell'anno 2017. L'analisi delle ricette spedite nelle farmacie aperte al pubblico del territorio della Asl Roma 3 è stata effettuata tramite il SISS Cineca analizzando la durata dei trattamenti e il numero di confezioni negli anni 2016/2017. Per il campione femminile 15-44aa estratto dall'anno 2017 sono state analizzate le contemporanee prescrizioni del gruppo ATCG03GA04 / G03GA02/ G03GA07 /G03GA06/ G03GA05 / G03GB02

Pazienti trattati  
in dimissioni  
L. 405/2001

Anno 2017 = 762

20,20% M

79,80% F

distribuzione diretta  
(L 648/96)

84,84% per profilassi in gravidanza  
per pazienti a rischio

15,16% per il trattamento nella  
sospensione AVK per manovre  
chirurgiche e/o invasive

### DURATA DEI TRATTAMENTI

Numero trattati	2016	2017
Con 1 - 10 confezioni	16.571	16.016
> 10 confezioni	1.692	1.578

Prescrizioni trattate con 1 - 10 confezioni	2016 N. prescrizioni	2017 N. prescrizioni
Flusso DPC	7.058	7.156
Flusso Convenzionata	24.257	23.469

Prescrizioni trattate con > 10 confezioni	2016 N. prescrizioni	2017 N. prescrizioni
Flusso DPC	5.364	5.426
Flusso Convenzionata	16.284	15.352

### FOCUS DONNE FASCIA 15-44 (USO IN CONCOMITANZA CON TERAPIE PER FECONDAZIONE ASSISTITA)

trattati con B01AB12-B01AB04-B01AB05-  
B01AB07-B01AB12-B01AB08-B01AX05  
con concomitante prescrizioni

ATC G03GA04 G03GA02 G03GA07  
G03GA06 G03GA05 G03GB02

seguiti 6 mesi prima e 6 mesi dopo la prescrizione indice

2017	Trattati con almeno 1 f B01AB12-B01AB04-B01AB05- B01AB07-B01AB12-B01AB08-B01AX05	Concomitanza trattamento con ATC G03GA04 G03GA02 G03GA07 G03GA06 G03GA05 G03GB02	
D 15-44	Trattati	Trattati	%
	1.818	55	3

**Conclusioni:** La distribuzione delle confezioni in convenzionata mostra chiaramente una disattenzione alle regole regionali con presenza di prescrizioni di durata limitata (presumibilmente in uso in profilassi) predominante in convenzionata (in luogo di DPC o DD) e viceversa per la prescrizione di lunga durata che non dovrebbero riguardare il flusso DPC ma solo la diretta o convenzionata. Nei flussi delle ricette spedite nelle farmacie compaiono trattamenti rivolti a donne probabilmente in stato di gravidanza che dovrebbero risultare in DD.